

Nær kontakt: Opfylder betingelserne for at være nær kontakt, dvs. dem, man aktuelt deler bopæl og husstand med.

Betydende symptomer: Symptomer på covid-19 sygdom som feber, ondt i halsen, vedvarende hoste, nysen og vejrtrækningsbesvær, hvor der samtidig er almen sygdomsfølelse hos den smittede, uden at der dog behøver at være funktionsindskrænkende sygdom, behov for behandling eller at den pågældende er uarbejdsdygtig.

Lette symptomer Ikke-betydende symptomer som løbenæse, 'kriller' i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående og uden almen sygdomsfølelse.

| | Isolation | Test | Afbrydelse af Isolation | Betaling | Refusion fra 1. fraværsdag |
|---|-----------|---|---|---------------|----------------------------|
| Nær kontakt | Nej | 3 døgn efter den smittedes testtidspunkt | - | Nej | Nej |
| Betydende symptomer | Ja | Snarest muligt | 4 døgn fra testtidspunkt/ symptomophør | Ja (sygeløn)* | (Ja) |
| Lette symptomer, (positiv test) | Ja ** | Snarest muligt | 4 døgn fra testtidspunkt | Ja (sygeløn) | Ja |
| Lette symptomer, (negativ test) | Nej | - | - | Nej | Nej |
| Andre kontakter / anden forøget risiko | Nej | Test (evt. selvtest) 3 døgn efter den smittedes testtidspunkt | - | Nej | Nej |

*: Betydende symptomer, hvor der ikke er testet positivt, vil formentligt skulle behandles som et helt sædvanligt sygdomstilfælde - eksempelvis almindelig influenza. Hvis der er testet positivt, vil der kunne opnås refusion fra 1. fraværsdag. I andre tilfælde gælder den almindelige arbejdsgiverperiode.

** : Hvis PCR-test udføres som første test, skal der ikke isoleres forud for test-svar. Er det en kviktest, skal der følges op med en PCR-test.